



Aliment granulé complémentaire de céréales et de tourrages



Destiné aux chevaux adultes en activité, aux juments en fin de gestation et en lactation, aux jeunes en croissance, Destrier pour Céréales corrige les déséquilibres des rations à base de céréales, en vitamines, minéraux et oligo-éléments, et les complète en proféines.



#### COMPOSITION :

Afin de présenter une qualité constante et garantie, les aliments DESTRIER sont formulés et fabriqués selon un cahier des charges très précis, à partir de matières premières (végétales et minérales) rigoureusement sélectionnées sur leurs caractéristiques nutritives et bactériologiques, systématiquement contrôlées par notre laboratoire d'analyses,

Informations pour l'utilisateur (au kg brut)		Constituants analytiques		Oligo-éléments en mg/kg		Additifs vitamines par kilo	
UFC	0,70	Protéines brutes	20 %	Fer	90 mg	Vitamine A	30 000 UI
MADC	155 g	Cendres brutes	20 %	Zinc	210 mg	Vitamine D3	4 800 UI
Calcium	24 g	Humidité	12 %	Manganèse	135 mg	Vitamine E	195 mg
Phosphore	8 g	Cellulose brute	14%	Cuivre	60 mg	Vitamine E naturelle*	195 mg
		Matières grasses brutes	2%	Sélénium dont 0,30 mg de levures au sé	0,60 mg lenium	Vitamine B1	15 mg

<sup>\*</sup> Les allments Destrier sont supplémentés en complexe Naturel TriPioX, issu de la recherche iNZO°, dont l'activité anti-oxydante (mesurée in vivo par le test KRL) vient doubler l'activité de la vitamine E.

Les aliments Destrier sont également supplémentés en vitamines B2, B5, B6, acide nicotinique, acide folique, biotine, chlorure de choline, cobalt, lode et sodium.

#### ■ RÈGLE GÉNÉRALES DE DISTRIBUTION DE LA RATION :

Fourrage: A distribuer au moins 1 heure avant la ration d'aliment concentré, sauf si le cheval en dispose à volonté.

Aliment concentré : Pour éviter l'encombrement et permettre une bonne assimilation de l'aliment, la quantité alstribuée par repas ne doit pas dépasser 0,5 % du poids vif, soit 2,5 kg d'aliment maximum pour un cheval de 500 kg.

Eau propre à volonté.









Pour une bonne efficacité nutritionnelle, la distribution de Destrier pour Céréales doit être faite à chaque repas. Le mélange Céréales et Destrier pour Céréales peut être préparé à l'avance pour la journée ou pour 2 à 3 jours, en fonction des conditions de stockage.

### Ration recommandée pour les chevaux adultes au travail

Fourrages + Aliment concentré : 30 % Destrier pour Céréales + 70 % céréales

Ration journalière pour un cheval d'un poids de 500 kg. Aliment concentré

- > 1.5 kg de Destrier pour Céréales et 3,5 kg de céréales
- + Fibres (Apport minimum recommandé):
  - > 1 kg par 100 kg de poids vif pour les chevaux sur litière de paille, soit 5 kg
  - > 1,5 kg par 100 kg de poids vif pour les chevaux sur litière inerte, soit 7,5 kg

### Ration recommandée pour les poulinières en fin de gestation et en lactation Fourrages + Aliment concentré : 50 % Destrier Céréales + 50 % céréales

Ration journalière pour une jument de 500 kg en pleine lactation. Allment concentré

- > 2 kg de Destrier pour Céréales et 2 kg de céréales
- + Fibres (Apport minimum recommandé):
  - > Fourrages (herbe pâturée ou foin) consommés librement

# « Ration recommandée pour les poulains de moins d'un an

Fourrages + Aliment concentré : 50 % Destrier Céréales + 50 % céréales

Ration journalière pour un poulain (objectif de polds adulte de 500 kg) dès les premières semaines jusqu'au sevrage :

Aliment concentré

- > 250 g de Destrier pour Céréales et 250 g de céréales
- + Fibres (Apport minimum recommandé):
  - > Fourrages (herbe pâturée ou foin) consommés librement

Ration journalière pour un poulain (objectif de poids adulte de 500 kg) du sevrage jusqu'à 1 an Aliment concentré

- >1,5 kg de Destrier pour Céréales et 1,5 kg de céréales + Fibres (Apport minimum recommandé) :
  - > Fourrages (herbe pâturée ou foin) consommés librement

# Ration recommandée pour les jeunes en croissance

Fourrages + Aliment concentré : 35 % Destrier Céréales + 65 % céréales

Ration journalière pour un jeune (objectif de poids adulte de 500 kg). Aliment concentré

- > 1 ka de Destrier pour Céréales et 2 ka de céréales
- + Fibres (Apport minimum recommandé):
  - > Fourrages (herbe pâturée ou foin) consommés librement

Les mesures sont habituellement graduées en litres, les préconisations nutritionnelles se font en kg brut.

Pensez à faire la conversion : 1L Destrier pour céréales = 650 g